

2. Potenzen mit ganzen Exponenten

Wird der Potenzbegriff auf negative Exponenten erweitert, dann können auch sehr „kleine“ Zahlen gut dargestellt werden.

Was bedeutet a^0 ?

Die Definition wird so festgelegt, dass die bisherigen Potenzgesetze gültig bleiben und die Erweiterung nicht auf Widersprüche führt (Permanenzprinzip).

Wegen des 1. Potenzgesetzes muss gelten

$$a^n \cdot a^0 = a^{n+0} = a^n$$

Dies führt auf die Definition:

$$a^0 = 1 \quad a \neq 0$$

Bemerkung: 0^0 wird nicht definiert.

Negative Exponenten

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1 \text{ also}$$

Definition:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

Ein Beispiel zum Potenzgesetz 2:

$$\frac{a^2}{a^5} = \frac{a \cdot a}{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a} = \frac{1}{a^3} = a^{-3} = a^{2-5}$$

Es kann gezeigt werden, dass bei dieser Erweiterung alle 5 Potenzgesetze gültig bleiben.

Beweis von P4 für negative ganze Exponenten:

Sei $n = -p \quad p \in \mathbb{N}$

$$(ab)^n = (ab)^{-p} = \frac{1}{(ab)^p} = \frac{1}{a^p b^p} = \frac{1}{a^p} \cdot \frac{1}{b^p} = a^{-p} b^{-p} = a^n \cdot b^n$$

In den Naturwissenschaften sind bei Masseinheiten folgende Vorsilben gebräuchlich:

Längeneinheiten

m: milli für $10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ z.B. 1 Millimeter

μ : micro für $10^{-6} = \frac{1}{10^6}$

n: nano für $10^{-9} = \frac{1}{10^9}$ z.B. 1 Nanometer bzw. 1 nm = 10^{-6} mm

p: pico für $10^{-12} = \frac{1}{10^{12}}$ z.B. 1 pm = 10^{-9} mm

Zur Illustration ein Vergleich aus Infochemie Nr. 11 / 8.11.1989 „Haben Sie gewusst, dass ...“

In der modernen Analytik können unvorstellbar kleine Spuren von Substanzen nachgewiesen werden:

1 Picogramm pro kg entspricht dem Nachweis von Substanzen in der Konzentration eines Würfelzuckers im Walensee mit seinen 2490 Milliarden Litern Wasser.

Infochemie Nr. 11 / 8. November 1989

10

I.C. - Haben Sie gewusst, dass ...

die moderne Analytik heute unvorstellbar kleine Spuren von Substanzen nachweisen und messen kann?

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung der speziellen Masseinheiten, die die Analytiker benutzen:

- 1 ppm (part per million) ist 1 Teil von 10^6 1 Million Teilen oder 1 Milligramm pro Kilogramm oder 0,001 g/kg.
Uebertragen auf die Zeitmessung entspricht das 31 Sekunden pro Jahr.
- 1 ppb (part per billion; Billion = englisch für Milliarde) ist 1 Teil von 10^9 1 Milliarde Teilen oder 1 Mikrogramm pro Kilogramm oder 0,000 001 g/kg.
In der Zeitmessung entspricht das 3/100 Sekunden pro Jahr.
- 1 ppt (part per trillion; Trillion = englisch für Billion) ist 1 Teil von 10^{12} 1 Billion Teilen oder 1 Nanogramm pro Kilogramm oder 0,000 000 001 g/kg.
In der Zeitmessung entspricht das 1 Sekunde in 31'688 Jahren.
- 1 ppq (part per quadrillion; Quadrillion = englisch für Billiarde) ist 1 Teil von 10^{15} einer Billiarde Teilen oder 1 Picogramm pro Kilogramm oder 0,000 000 000 001 g/kg.
Dies entspricht dem Nachweis von Substanzen in der Konzentration eines Würfelzuckers im Walensee mit seinen 2'490 Milliarden Litern Wasser.

Bei der EMPA (empa-akademie@empa.ch) ist die Publikation „Reise in die Welt des Nanometers“ gratis erhältlich.

Darstellung von sehr kleinen Zahlen im wissenschaftlichen Format:

$$0.00000064 = 6.4 \cdot 10^{-7}$$

Eine Multiplikation mit 10^{-7} bedeutet eine Verschiebung des Dezimalpunkts um 7 Stellen nach links. Die 6 erscheint an 7. Stelle nach dem Dezimalpunkt.

$$0.0000000000129 = 1.29 \cdot 10^{-11}$$

Die Masse eines Elektrons ist $9.1 \cdot 10^{-31}$ kg. Die Ziffer 9 steht an 31. Stelle nach dem Dezimalpunkt.

Beispiele:

$$(-1)^{-2n} = (-1)^{2n} = 1$$

Der Exponent ist gerade

$$(-1)^{-(2n-1)} = (-1)^{2n-1} = -1$$

Der Exponent ist ungerade

$$-2^{-3} = -\frac{1}{8} \quad (-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$$

der Exponent ist ungerade

$$-2^{-4} = -\frac{1}{16} \quad (-2)^{-4} = \frac{1}{16}$$

der Exponent ist gerade

$$(-a^{-4})^{-3} = -a^{12} \text{ aber } (-a^{-3})^{-4} = a^{12}$$

P3

$$y^{-3} \cdot y^7 = y^4$$

P1

$$(a^3 + 4a^{-3} - 3) \cdot (a + 2a^{-2}) = a^4 + 8a^{-5}$$

P1

$$\frac{x^2}{x^{-6}} = x^{2-(-6)} = x^8$$

P2

$$4^{-3} 25^{-3} = (4 \cdot 25)^{-3} = (10^2)^{-3} = 10^{-6}$$

P4; 3

$$\frac{15^{-4}}{5^{-4}} = \left(\frac{15}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{15}\right)^4 = \frac{1}{81}$$

P5

$$\frac{1}{x^{-n}} = \frac{x^0}{x^{-n}} = x^{0-(-n)} = x^n$$

oder mit x^n erweitern

P2

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{x}{y}\right)^n} = \frac{1}{\frac{x^n}{y^n}} = \frac{y^n}{x^n} = \left(\frac{y}{x}\right)^n$$

Zähler und Nenner werden vertauscht, aber

beim folgenden Beispiel ist mit x^6 zu erweitern

$$\frac{x^{-4} - x^{-6}}{x^{-2} - x^{-3}} = \frac{x^2 - 1}{x^4 - x^3} = \frac{(x-1) \cdot (x+1)}{x^3 \cdot (x-1)} = \frac{x+1}{x^3} = \frac{x}{x^3} + \frac{1}{x^3} = x^{-2} + x^{-3}$$

P5

$$((4a^2)^{-2} (2a^0)^3)^{-1} = (4^{-2} a^{-4} 2^3)^{-1} = (2^{-4} a^{-4} 2^3)^{-1} = (2^{-1} a^{-4})^{-1} = 2a^4$$

$$((-2)^{-2})^{-2} - (-2^2) = 20$$

$$\frac{(15x^2 - 6x)^{3n}}{(5x - 2)^{3n}} = (3x)^{3n}$$

$$\left(\frac{3u^2 v^3}{4u^3 v^2}\right)^2 : \left(\frac{3v^4}{2u^2}\right)^3 = \frac{u^4}{6v^{10}}$$

$$\frac{(b-a)^{2k}}{(a^2 - b^2)^{2k}} = (a+b)^{-2k}$$

$$\left(\frac{3a^{-2}}{2b^{-4}}\right)^{-3} : \left(\frac{4a^3 b^{-2}}{3a^{-2} b^3}\right)^2 = \frac{1}{6a^4 b^2}$$

$$\left(\frac{1-a}{1+a}\right)^{-3} \left(\frac{a+1}{a-1}\right)^{-2} \frac{1}{1-a^2} = \frac{1}{(1-a)^2}$$

Die Lösung dieser Aufgabe kann mit einer Substitution vereinfacht werden.

Dazu setzt man etwa $1+a=c$ und $1-a=d$

$$\frac{c^{-3}d^{-2}}{d^{-3}c^{-2}cd} = c^{-2} = \frac{1}{c^2} = \frac{1}{(1-a)^2}$$

Eine Gleichung: $9 \cdot 3^{2x} = 3^{x+1}$ $x = ?$
 $3^2 \cdot 3^{2x} = 3^{2x+2} = 3^{x+1}$

Aus der Gleichheit der Zahlen folgt die Gleichheit der Exponenten

$$2 + 2x = x + 1 \text{ und daraus } x = -1$$

3. Potenzen und Taschenrechner (TR)

Wie gibt man Zahlen der Form $a \cdot 10^b$ mit dem TR ein?

Normalform	wissenschaftliche Form	TR
32000	$3.2 \cdot 10^4$	3.2 EE 4
-32000	$-3.2 \cdot 10^4$	3.2 +/- EE 4
0.0032	$3.2 \cdot 10^{-3}$	3.2 EE 3 +/-
-0.0032	$-3.2 \cdot 10^{-3}$	3.2 +/- EE 3 +/-

Der Exponent gibt an, um wie viele Stellen der Dezimalpunkt beim Übergang von der wissenschaftlichen Form in die Normalform nach links (negativer Exponent) oder nach rechts (positiver Exponent) verschoben werden muss.

Wechsel der Einheiten

$$km \xrightarrow{\cdot 10^3} m \xrightarrow{\cdot 10^2} cm \xrightarrow{\cdot 10} mm \text{ bzw. } km \xrightarrow{\cdot 10^6} mm \quad \text{oder umgekehrt } mm \xrightarrow{\cdot 10^{-6}} km$$

Beispiele:

3.4 km in mm entsprechen $3.4 \cdot 10^6$ mm

0.0034 mm in km entsprechen $3.4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} = 3.4 \cdot 10^{-9}$ mm

Auch wenn ein Taschenrechner zur Verfügung steht, ist es zu empfehlen, bei einfachen Rechnungen das Kopfrechnen zu üben. Fehler passieren oft, wenn die Reihenfolge der Operationen nicht beachtet wird.

$$(3+4) \cdot 5 = 35$$

$$\frac{10+5}{5} = 3$$

$$\frac{30}{5+10} = 2$$

$$\frac{54}{3 \cdot 6} = 3$$

$$(3+4) \cdot 5 = 35$$

$$3 + 4^2 = 19$$

$$3 \cdot 4^2 = 48$$

$$(3 \cdot 4)^2 = 144$$

$$-1^2 = -1$$

$$(-1)^2 = 1$$

Wie lautet die grösste Zahl, die mit 3 Ziffern geschrieben werden kann?

Kandidaten:

1) 999

2) $99^9 = 9.14 \text{ E } 17$ 9 Faktoren 99

3) $9^{99} = 2.95 \text{ E } 94$ 99 Faktoren 9

4) $(9^9)^9 = 9^{81} = 1.97 \text{ E } 77$ 81 Faktoren 9

5) $9^{9^9} = 9^{(9^9)}$ $9^9 = 387\,420\,489$ Faktoren 9

Diese Zahl würde mit ihren 369 693 100 Stellen mehr als 50 000 "Tagesanzeiger-Magazin"-Seiten füllen.

In den folgenden Beispielen ist das Resultat zunächst grob abzuschätzen

Tipps:

Zehnerpotenzen im Kopf verrechnen

Im Zweifelsfall Klammern setzen

Resultate auf Plausibilität prüfen!

Allfällige Zwischenresultate speichern

Resultate mit vernünftiger Genauigkeit angeben

$$x = 2.43 \cdot 10^7 \cdot 4.2 \cdot 10^5 \quad \text{geschätztes Resultat: } x \approx 2.5 \cdot 4 \cdot 10^7 \cdot 10^5 = 10 \cdot 10^{12} = 10^{13}$$

mit TR: $1.0206 \cdot 10^{13}$

$$x = \frac{2.2 \cdot 10^4}{0.7 \cdot 10^{-2}} \quad \text{geschätztes Resultat: } x \approx 3 \cdot 10^6, \text{ mit TR } x = 3.14 \cdot 10^6$$

$$x = 7.8 \cdot 10^4 - 1.2 \cdot 10^3 \quad \text{geschätztes Resultat: } x \approx 80 \cdot 10^3 - 10^3 = 79 \cdot 10^3 \approx 79000$$

mit TR: 76800

$$x = \frac{3 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^{-2} \cdot 7.3 \cdot 10^5} \quad \text{geschätztes Resultat: } x \approx \frac{60}{73} \approx \frac{60}{72} \approx \frac{5}{6} \quad \text{mit TR: } 0.821$$

Die folgenden beiden Beispiele testen die Genauigkeit des TR:

a)

Berechne den Wert von $9x^4 - y^4 + 2y^2$ für $x = 10864$ und $y = 18817$

Der richtige Wert des Ausdrucks ist 1.

b)

Berechne den Wert von $a + b - a$ für $a = 10^{34}$ und $b = -2$

Der richtige Wert des Ausdrucks ist -2.

Vergleiche für sehr grosse oder sehr kleine Zahlen:

a)

Es sind die folgenden Behauptungen zu überprüfen:

Das geometrische Mittel der Masse der Sonne von $2 \cdot 10^{30}$ kg und der Masse eines Protons von $1.7 \cdot 10^{-27}$ kg ergibt ungefähr die Masse eines Menschen.

$$2 \cdot 10^{30} \cdot 1.7 \cdot 10^{-27} \approx 58.3 \text{ kg}$$

b)

Der Chef der Deutschen Bank bezog 2006 als Lohn 12 Millionen Euro. Dies entspricht 1 Euro pro Sekunde.

c)

Die Erdbevölkerung beträgt im Jahr 2010 ca. 6.5 Milliarden Menschen. Der Bodensee hat eine Fläche von 536 km^2 . Wir nehmen an, dass auf einem Quadratmeter 4 Personen Platz haben. Dann haben auf dem Bodensee 2.1 Milliarden Menschen Platz, also ca. ein Drittel der Menschheit.

d)

Nehmen wir an, es sei möglich, ein Würfelchen von 1 cm^3 dicht mit Protonen zu füllen

Volumen des Protons: $V_p = 4 \cdot 10^{-45} \text{ m}^3 = 4 \cdot 10^{-39} \text{ cm}^3$, Masse des Protons $m_p = 1.7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Die Masse des Würfelchens würde dann:

$$m = 1.7 \cdot 10^{-27} \cdot \frac{1}{4 \cdot 10^{-39}} \approx 4.25 \cdot 10^8 \text{ t betragen.}$$

e)

Ein 0.2 mm dickes Papier wird - wenigstens in Gedanken - 50-mal so gefaltet, dass sich die Dicke bei jeder Faltung verdoppelt. Berechne die Höhe des Stapels in Kilometern.

Höhe des Stapels $2^{51} \cdot 10^{-7} \text{ km} = 225\,179\,981.3885248 \text{ Kilometer (Vergleich?)}$

Soll der Stapel am Schluss eine Grundfläche von 10 cm^2 haben (grössere Briefmarke), so müsste der Bogen anfänglich rund $1\,125\,900 \text{ km}^2$ messen (2^{50} geteilt durch 10^9) Dies entspricht ungefähr der Fläche von Schweden, Norwegen und Deutschland zusammen.

Zum Vergleich bei den folgenden Beispielen siehe Seite 2 Haben Sie es gewusst?

f)

Eine Ölschicht auf ruhendem Wasser ist ca. 10^{-8} m dick. Welche Fläche kann ein Liter Öl bedecken?

Resultat 10^5 m^2 (Angaben ohne Gewähr)

g)

Wie viele Blutkörperchen enthalten 6 Liter Blut eines Menschen, wenn 1 mm^3 durchschnittlich 5 Millionen enthält?

$$5 \cdot 10^{13}$$

h)

In der Homöopathie werden Mittel hergestellt, indem sie immer wieder verdünnt und anschliessend geschüttelt werden. Der Ausdruck „Potenzierung D4“ bedeutet, dass der Wirkstoff 4 mal hintereinander geschüttelt und dann mit dem Faktor 10 verdünnt wird. Die Konzentration des Wirkstoffs in der Verdünnung ist dann also 1:10000.

Wie viel Gramm Wirkstoffe ist in einer Tablette der Masse 1g mit der Potenz D24 enthalten?

Die Masse eines Wirkstoffmoleküls betrage ca. $4 \cdot 10^{-23} \text{ Gramm}$. Wie viele Atome sind in einer Tablette eines Präparats D24 enthalten?

Resultate (Angaben und Lösungen ohne Gewähr):

f) 10^5 m^2 g) $5 \cdot 10^{13}$ h) ?