

3. Fall: $n = m + 1$ Der Zählergrad ist um 1 grösser als der Nennergrad

$$F(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{2x} \quad x \neq 0$$

1. Nullstellen:

$$x^2 - 5x + 4 = (x-1) \cdot (x-4) = 0$$

Nullstellen 1. Ordnung

bei $x_1 = 1$ und $x_2 = 4$ mit VZW

2. Polstellen 1. Ordnung

bei $x = 0$ mit VZW

3. Asymptotisches Verhalten:

Division des Zählerpolynoms
durch das Nennerpolynom:

$$\frac{x^2 - 5x + 4}{2x} = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} + \frac{2}{x}$$

Für betragsgrössere x verhält
sich $F(x)$ wie die lineare

Ersatzfunktion $g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$ d.h. es gilt:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \left(F(x) - \left(\frac{1}{2}x - \frac{5}{2} \right) \right) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0$$

d.h. der Graph hat eine sogenannte schiefe Asymptote mit der Gleichung $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$

4. Extrema

$$F'(x) = \left(\frac{x^2 - 5x + 4}{2x} \right)' = \frac{x^2 - 4}{2x^2} = 0$$

Tiefpunkt $T(2, -\frac{1}{2})$ Vorzeichenwechsel von F' von $-$ nach $+$

Hochpunkt $H(-2, -\frac{9}{2})$ Vorzeichenwechsel von F' von $+$ nach $-$

5. Stellt man die Funktionsgleichung in der folgenden Form dar

$$F(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{2x} = \frac{x^2 + 4}{2x} - \frac{5}{2}$$

dann ist die Zentralsymmetrie des Graphen bezüglich des
Schnittpunkts $S(0, -\frac{5}{2})$ der beiden Asymptoten zu erkennen.


Allgemein gilt

Satz:

Ist der Grad des Zählerpolynoms um 1 grösser als der Grad des Nennerpolynoms, dann hat der Graph von F eine schiefe Asymptote.

Übungsaufgabe:

$$F(x) = \frac{(x-2)^2}{2x}$$



An den folgenden Beispielen werden andere Möglichkeiten gezeigt, die Gleichung der schiefen Asymptoten zu bestimmen:

$$F(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1} \quad x \neq -1$$

1.

Dividiert man den Zähler durch den Nenner, so erhält man einen linearen Term $ax + b$ und einen Rest r d.h. es gilt:

$$x^2 - 3x = (x + 1) \cdot (ax + b) + r = ax^2 + (b + a) \cdot x + (b + r)$$

Koeffizientenvergleich ergibt $a = 1$, $b = -4$ und $r = 4$ und damit die gewünschte Darstellung (1)

2. Mit dem Horner Schema

$$\begin{array}{r} 1 \quad -3 \quad 0 \\ \quad -1 \quad 4 \\ \hline 1 \quad -4 \quad 4 \end{array} \quad x = -1$$

$$F(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1} = x - 4 + \frac{4}{x + 1} \quad (1)$$

Gleichung der schiefen Asymptoten $y = x - 4$

3.

$$m = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{x - 3}{x + 1} = 1$$

$$q = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x}{x + 1} - x = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \left(-\frac{4x}{x + 1} \right) = -4$$

4.

Erweitern nach der 3. binomischen Formel:

$$F(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1} = \frac{(x - 3) \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)}{\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{x - 4 + \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}}$$

ergibt die richtige Gleichung der schiefen Asymptoten $y = x - 4$

Übungsaufgaben:

Gesucht ist die Gleichung der schiefen Asymptoten des Graphen der Funktion

$$F(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} \quad \text{b) } F(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{2x - 4}$$

Lösungen:

a) $y = x + 2$

b) $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$