

7. Bestimmtes Integral und Flächeninhalt


In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen dem bestimmten Integral und dem Flächeninhalt untersucht werden.

In diesem einführenden Beispiel sind die folgenden bestimmten Integrale zu berechnen:

$$(1) \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = \cos x \Big|_{\pi}^0 = 2$$

$$(2) \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = \cos x \Big|_{2\pi}^{\pi} = -2$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = \cos x \Big|_{2\pi}^0 = 0$$



Satz:

1

Ist in einem Intervall der Integrand nicht negativ, so gibt das bestimmte Integral den Inhalt des von der Kurve $y = f(x)$, der x-Achse und den Parallelen $x = a$ bzw. $x = b$ eingeschlossenen Flächenstücks an. vgl. (1)

2

Ist in einem Intervall der Integrand negativ, so gibt das bestimmte Integral den mit dem Faktor (-1) multiplizierten Flächeninhalt an. vgl. (2)

3

Hat ein bestimmtes Integral den Wert 0, so bedeutet dies, dass die oberhalb bzw. unterhalb der x-Achse gelegenen Flächen denselben Inhalt haben.

Der Satz folgt aus der Definition des bestimmten Integrals. Im Falle (2) ist jeder Summand $f(x_k) \cdot \Delta x$ negativ.

Aufgabe:

Die folgenden bestimmten Integrale sind mit geometrischen Überlegungen zu berechnen.


$$a) \int_0^2 f(x) dx = 2 \quad \text{Dreiecksinhalt } 2$$

$$b) \int_2^7 f(x) dx = -6 \quad \text{Trapezinhalt } 6$$

$$c) \int_0^7 f(x) dx = 2 - 6 = -4$$

$$d) \int_0^8 f(x) dx = 2 - 6 + \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$


$$e) \int_1^4 |f(x)| dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$



Bei der Berechnung von bestimmten Integralen ergeben sich für symmetrische Graphen folgende Vereinfachungen:

Es sei der Graph G_f axialsymmetrisch zur y-Achse, d.h. es gilt $f(-x) = f(x)$ im Intervall $[-a, a]$


$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$



Es sei G_f zentrisymmetrisch zum Nullpunkt, d.h. es gilt $f(-x) = -f(x)$ im Intervall $[-a, a]$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Oberhalb bzw. unterhalb der x-Achse liegende Gebiete haben den gleichen Inhalt.



Beispiele:

$$\int_{-2}^2 (2x + 3x^2 - x^3) dx = \int_{-2}^2 (2x - x^3) dx + \int_{-2}^2 3x^2 dx = 0 + 2 \cdot \int_0^2 3x^2 dx = 2 \cdot x^3 \Big|_0^2 = 16$$

Der Integrand wird in zwei Summanden zerlegt. Der Graph des 1. Summanden ist zentrisymmetrisch, der des 2. axialsymmetrisch.

Why ist $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^1 x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} \Big|_{-1}^1 = x^{-1} \Big|_1^{-1} = -2$ obviously wrong?

Die Stelle $x = 0$ ist eine Polstelle. Deshalb ist das bestimmte Integral nicht definiert.

8. Flächen zwischen zwei Kurven

Die Kurven $y = f(x)$ bzw. $y = g(x)$ und die Parallelen $x = a$ und $x = b$ begrenzen ein Flächenstück, dessen Inhalt I zu berechnen ist.

Zusätzliche Voraussetzung:


Im Intervall $[a, b]$ sei $f(x) \geq g(x) \geq 0$

Für den gesuchten Flächeninhalt I gilt:

$$I = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Bemerkung:

Der Term nach dem Integralzeichen kann als Inhalt eines infinitesimalen Rechtecks der Höhe $f(x) - g(x)$ und der Breite dx aufgefasst werden.



Aufgabe:


Welchen Inhalt I hat die von der Parabel mit der Gleichung $y = \frac{1}{4}x^2 + 1$ und der Parallelen zur x -Achse mit der Gleichung $y = 5$ begrenzte Fläche?

Schnittpunkte:

$$\frac{1}{4}x^2 + 1 = 5 \quad \frac{1}{4}x^2 = 4 \quad x_{1,2} = \pm 4$$

$$I = \int_{-4}^4 \left(5 - \left(\frac{1}{4}x^2 + 1 \right) \right) dx = 2 \cdot \int_0^4 \left(4 - \frac{1}{4}x^2 \right) dx$$

$$= 2 \cdot \left(4x - \frac{x^3}{12} \right) \Big|_0^4 = 2 \cdot \left(16 - \frac{64}{12} \right) = \frac{64}{3} = \frac{2}{3} \cdot 8 \cdot 4$$



Bemerkung:


Die Lösung wird vereinfacht, wenn die Symmetrie beachtet wird.

Das Ergebnis ist ein Spezialfall des folgenden Satzes, der auf Archimedes zurückgeht:

Satz:

Die Fläche eines Parabelsegments ist gleich zwei Drittel der Fläche des dem Segment umschriebenen Parallelogramms. (archimedische Formel)

$$A = \frac{2}{3} sh$$



Bei den folgenden Aufgaben ist der Inhalt I der eingeschlossenen Flächen gesucht:

1.


Das "vierblättrige" Kleeblatt.

Zunächst kann der Inhalt I_1 des von der 1. Winkelhalbierenden $y = x$ und der Parabel $y = x^2$ im 1. Quadranten begrenzten Flächenstücks bestimmt werden. I ist achtmal so gross.

$$I = 8I_1 = 8 \int_0^1 (x - x^2) dx = 8 \left(\frac{1}{2}x - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right) = 8 \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$$

Das Integral $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ kann elementar

berechnet werden (halbes Einheitsquadrat!)



Zusatzfrage:

Winkel bei der Blattspitze? (36.8°)

2. (ac)

Die Kurve $k: y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x$ bildet zusammen mit ihrem Spiegelbild an der 1. Winkelhalbierenden $w_1: y = x$ eine blattförmige Figur mit der Spitze S und der grössten Blattbreite AB

Gesucht sind

- die Blattspitze S und der Winkel α bei S
- die Blattbreite b
- der Inhalt der Blattfläche

a)

Aus der Gleichung

$$\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x = x \quad \text{folgt}$$

$$\frac{1}{3}x^2 \cdot (x - 3) = 0 \quad \text{mit den Lösungen}$$

$$x_{1,2} = 0 \quad \text{und} \quad x_3 = 3 \quad \text{und damit} \quad S(3, 3).$$

$$\text{Mit } f'(x) = x^2 - 2x + 1 \text{ folgt } f'(3) = 4 = \tan(\varphi)$$

$$\text{und daraus } \alpha = 2 \cdot (\varphi - 45^\circ) \approx 61.9^\circ$$

b)

In B ist die Tangente parallel zu w_1 . Damit gilt:

$$f'(x) = x^2 - 2x + 1 = 1 \quad \text{mit den Lösungen } x_1 = 0 \quad \text{und} \quad x_2 = 2$$


Die Koordinaten von A und B ergeben sich zu $B(2, \frac{2}{3})$ und für den gespiegelten

Punkt $A(\frac{2}{3}, 2)$ Für die Blattbreite ergibt sich aus der Abstandsformel $\overline{AB} = \frac{4}{3}\sqrt{2}$.

c)

Wegen der Axialsymmetrie ergibt sich die Fläche zu

$$I = 2 \cdot \left(\int_0^3 x - \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right) dx \right) = 2 \cdot \left(\int_0^3 \left(-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right) dx \right) = 2 \cdot \left[-\frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^3 = \frac{9}{2}$$



Der eingangs erwähnte Satz:

$$I = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

gilt auch, wenn die betrachtete Fläche teilweise unterhalb der x-Achse liegt:

Beweis:

Das Flächenstück kann so um c Einheiten in y -Richtung verschoben werden, dass es ganz oberhalb der x -Achse zu liegen kommt. Die Gleichungen der verschobenen Kurven heißen nun:

$y = f(x) + c$ bzw. $y = g(x) + c$ mit geeignetem c . Bei der Integration der Differenz fällt die Konstante weg.

1.

Welchen Inhalt hat das von der Parabel $p: y = 1 - \frac{1}{4}x^2$ und der Parabelsehne $AB(-2, 0)B(4, -3)$ eingeschlossene Gebiet?


Gleichung der Geraden AB :

$$y = g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

$$I = \int_{-2}^4 \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx - \int_{-2}^4 g(x) dx$$

$$= \left(x - \frac{x^3}{12}\right) \Big|_{-2}^4 - \int_{-2}^4 g(x) dx$$

$$= 0 - (-9) = 9$$



Das erste Integral hat den Wert 0. Dies bedeutet geometrisch, dass das Gebiet oberhalb der x -Achse im Intervall $[-2, 2]$ und das Gebiet unterhalb der x -Achse im Intervall $[2, 4]$ gleichen Inhalt haben. Der Wert des 2. Integrals kann elementargeometrisch bestimmt werden. Es entspricht dem mit (-1) multiplizierten Inhalt des Dreiecks ABC (das Dreieck liegt unterhalb der x -Achse).


2.

Inhalt des von den Kurven

$$y = f_1(x) = \sin x \text{ und}$$

$$y = f_2(x) = \cos x$$

eingeschlossenen Gebiets.



Schnittpunkte:

$$\sin x = \cos x \quad | : \cos x \neq 0$$

$$\tan x = 1$$

$$x_1 = \frac{\pi}{4} \quad x_2 = \frac{5\pi}{4} \quad I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx = (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} = (\cos x + \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} = 2\sqrt{2}$$

3.

Die beiden Kurven

$$y = f_1(x) = e^x \quad \text{und} \quad y = f_2(x) = \ln x$$

schneiden aus dem Quadrat ABCD das Gebiet AFGCEHA aus. Wie gross ist sein Inhalt I?

Aus Symmetriegründen gilt:

$$I = 25 - 2K$$

Die x-Koordinate von E ergibt sich aus der

Bedingung $e^x = 5$ zu $x = \ln 5$


$$K = \int_0^{\ln 5} (5 - e^x) dx = (5x - e^x) \Big|_0^{\ln 5} = 5 \ln 5 - 4$$

Liegt die später hergeleitete Stammfunktion z.B. aus einer Formelsammlung vor, so ist auch folgende Lösungsvariante möglich:

$$K = \int_1^5 \ln x dx = x \cdot (\ln x - 1) \Big|_1^5 = 5 \ln 5 - 4$$

Damit gilt:

$$I = 25 - 2 \cdot (5 \cdot \ln 5 - 4) = 33 - 10 \cdot \ln 5 \approx 16.91$$



4.

Die Kurve $y = e^x$ begrenzt mit der x-Achse und zwei zur y-Achse symmetrisch liegenden Parallelen ein Flächenstück. Bestimme den Abstand u der beiden Parallelen von der y-Achse so, dass die y-Achse den Inhalt des Flächenstücks im Verhältnis 1:2 teilt.

$$2 \int_{-u}^0 e^x dx = \int_0^u e^x dx$$

$$2(1 - e^{-u}) = e^u - 1 \quad \text{Substitution } z = e^u$$


$$2 - \frac{2}{z} = z - 1$$

$$z^2 - 3z + 2 = (z-1) \cdot (z-2) = 0$$

mit den Lösungen ($z_1 = 1$) und $z_2 = 2$.

Die Gleichung

$$z = e^u = 2 \quad \text{hat die Lösung } u = \ln 2$$




5.

Für welchen Wert des Parameters a schneiden sich die Kurven $k_1: y = \sin(ax)$ und $k_2: y = x^2$ an der Stelle $x = 1$. Welchen Inhalt hat das von den beiden Kurven begrenzte Gebiet I?

Die Gleichung $\sin a = 1$ hat die Lösung $a = \frac{\pi}{2}$
Es ist zu empfehlen, diesen Wert von a erst am Schluss einzusetzen.

$$\begin{aligned} \int_0^1 (\sin(ax) - x^2) dx &= \left(-\frac{\cos(ax)}{a} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 \\ &= \left(\frac{\cos(ax)}{a} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = -\left(\frac{\cos a}{a} + \frac{1}{3} - \frac{\cos 0}{a} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{1}{3} \end{aligned}$$



6.

Gegeben sind die beiden Kurven

$$y = f_1(x) = \frac{1}{a} \cdot x^2 \quad \text{und}$$

$$y = f_2(x) = a^2 \cdot \sqrt{x} \quad \text{wobei } a > 0.$$

Es ist zu zeigen, dass die drei Gebiete in der Abbildung inhaltsgleich sind:

$$A_1 = A_2 = A_3$$

Koordinaten der Schnittpunkte der beiden Kurven:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \cdot x^2 &= a^2 \cdot \sqrt{x} = a^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} \\ \frac{1}{a} \cdot x^2 - a^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} &= \frac{1}{a} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot (x^{\frac{3}{2}} - a^3) = 0 \end{aligned}$$

Die Lösungen $x_1 = 0$ oder $x_2 = a^2$ ergeben die Koordinaten der Schnittpunkte $(0,0)$ bzw. (a^2, a^3) .

Damit ist zu zeigen, dass gilt:


$$A_1 = A_2 = A_3 = \frac{1}{3} \cdot a^5$$

$$A_1 = \frac{1}{a} \int_0^{a^2} x^2 dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{a^2} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{3} \cdot a^6 = \frac{1}{3} \cdot a^5$$

Zunächst kann $A_1 + A_2$ berechnet werden:

$$A_1 + A_2 = a^2 \cdot \int_0^{a^2} x^{\frac{1}{2}} dx = a^2 \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^{a^2} = a^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot a^3 = \frac{2}{3} \cdot a^5 \quad \text{woraus } A_2 = \frac{1}{3} \cdot a^5 \text{ folgt.}$$

Da der Inhalt des Rechtecks gleich a^5 ist, ist die Behauptung damit bewiesen.



7.

Gegeben ist der Graph der Funktion f mit der Gleichung $f(x) = \frac{1}{4}x^3$ im Intervall $[0, 2]$.


Durch die Kurvenpunkt P wird eine Parallele zur x -Achse gezogen. Wie ist P zu wählen, dass die dadurch bestimmten Gebiete inhaltsgleich sind?

Wir bezeichnen die Koordinaten des gesuchten Punktes P mit $P(t, \frac{1}{2} t^3)$.

Da die beiden Flächeninhalte A_1 und A_2 gleich gross sind, hat das folgende Integral den Wert 0:

$$\int_0^2 (\frac{1}{4}t^3 - \frac{1}{4} \cdot x^3) dx = 0$$

Bei der Integration über die beiden Teilintervalle $[0, t]$ bzw. $[t, 2]$ wird nämlich A_1 positiv, A_2 hingegen negativ gezählt.



$$\int_0^2 (\frac{1}{4}t^3 - \frac{1}{4} \cdot x^3) dx = \frac{1}{4} \cdot \int_0^2 (t^3 - x^3) dx = \frac{1}{4} \cdot (t^3 x - \frac{1}{4} \cdot x^4) \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \cdot (2 \cdot t^3 - 4) = 0$$

Uns daraus: $t^3 = \frac{1}{2}$ mit der Lösung $t = 2^{\frac{1}{3}}$

Damit hat der gesuchte Punkt P die Koordinaten $P(2^{\frac{1}{3}}, \frac{1}{2})$

Übungsaufgaben:

1.

Das von der Kurve mit der Gleichung $y = \frac{1}{x^2}$ $x \neq 0$, der x-Achse und den


Geraden $x = 1$ bzw. $x = 3$ eingeschlossene Flächenstück soll an der Stelle u durch eine Parallele zur y-Achse in zwei flächengleiche Teile zerlegt werden.

Bedingung:

$$\int_1^u \frac{1}{x^2} dx = \int_u^3 \frac{1}{x^2} dx \quad -\frac{1}{x} \Big|_1^u = -\frac{1}{x} \Big|_u^3$$

$$\frac{1}{x} \Big|_u^1 = \frac{1}{x} \Big|_3^u \quad 1 - \frac{1}{u} = \frac{1}{u} - \frac{1}{3}$$

$$u = \frac{3}{2}$$



2.

Der Parameter a ist so zu bestimmen, dass sich die quadratische Parabel $y = x^2 + a$ und die Kurve $y = \cos x$ an der Stelle $x = \frac{\pi}{2}$ schneiden. Welchen Inhalt hat das von den beiden Kurven bestimmte Gebiet?

Lösung:

$$a = -\frac{\pi^2}{4}$$

$$I = 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - (x^2 + a)) dx$$

$$= 2 \cdot \left[\sin x - \left(\frac{x^3}{3} + ax \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 2 + \frac{\pi^3}{6}$$

